

Analisi dei ricoveri ospedalieri in area metropolitana collegati ad uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2005

Tab. 1 . Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2005

Tab. 2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2005

Tab. 3 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2005

Tab. 4 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2005

Tab. 5 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti

Tab. 6 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2005

Tab 1. Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Caratteristiche socio-anagrafiche - Periodo 2000-2005

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale soggetti	370		378		302		295		323		353	
M	251	67,8	241	63,8	189	62,6	191	64,7	208	64,4	228	64,6
F	119	32,2	137	36,2	113	37,4	104	35,3	115	35,6	125	35,4
italiani	323	87,3	330	87,3	256	84,8	263	89,2	291	90,1	316	89,5
stranieri	47	12,7	30	7,9	39	12,9	32	10,8	29	9,0	37	10,5
metropoli	281	75,9	295	78,0	226	74,8	223	75,6	261	80,8	304	86,1
fuori metropoli	89	24,1	83	22,0	76	25,2	72	24,4	61	18,9	48	13,6
età media	35,0		37,7		35,5		36,6		39,6		41,6	

Tab. 2 Ricoveri effettuati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti - Periodo 2000-2005

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Totale ricoveri	498		463		418		415		436		444	
M	337	67,7	298	64,4	252	60,3	281	67,7	292	67,0	292	65,8
F	161	32,3	163	35,2	166	39,7	134	32,3	144	33,0	152	34,2
italiani	437	87,8	409	88,3	368	88,0	376	90,6	400	91,7	401	90,3
stranieri	59	11,8	34	7,3	42	10,0	39	9,4	33	7,6	43	9,7
metropoli	390	78,3	364	78,6	329	78,7	322	77,6	357	81,9	389	87,6
fuori metropoli	107	21,5	99	21,4	85	20,3	90	21,7	78	17,9	54	12,2

**Tab. 3 Soggetti ricoverati presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2005**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	soggetti	%	soggetti	%	soggetti	%	soggetti	%	soggetti	%	soggetti	%
	370		378		302		295		323		353	
Barbiturici	12	3,2	22	5,8	14	4,6	15	5,1	25	7,7	29	8,2
Cocaina	26	7,0	27	7,1	29	9,6	31	10,5	39	12,1	35	9,9
Cannabinoidi	14	3,8	14	3,7	19	6,3	23	7,8	18	5,6	27	7,6
Allucinogeni	8	2,2	6	1,6	3	1,0	4	1,4	2	0,6	3	0,8
Oppioidi	214	57,8	217	57,4	171	56,6	158	53,6	205	63,5	140	39,7
Antidepressivi	2	0,5	2	0,5	2	0,7	1	0,3	1	0,3	3	0,8
eroina	7	1,9	4	1,1	1	0,3	1	0,3			2	0,6
amfetamine	4	1,1			3	1,0	4	1,4			3	0,8

**Tab. 4 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti
Raffronti per sostanza - Periodo 2000-2005**

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	ricoveri	%	ricoveri	%	ricoveri	%	ricoveri	%	ricoveri	%	ricoveri	%
	498		463		418		415		436		444	
barbiturici	14	2,8	24	5,2	18	4,3	17	4,1	25	5,7	30	6,8
cocaina	32	6,4	29	6,3	37	8,9	40	9,6	51	11,7	43	9,7
cannabinoidi	15	3,0	17	3,7	23	5,5	26	6,3	20	4,6	41	9,2
allucinogeni	10	2,0	6	1,3	3	0,7	5	1,2	2	0,5	3	0,7
oppioidi	289	58,0	265	57,2	230	55,0	220	53,0	205	47,0	174	39,2
antidepressivi									1	0,2	3	0,7
amfetamine	4	0,8			3	0,7	4	1,0			4	0,9

Tab. 5 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti

giorni degenza	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%	gg deg	%
totale	8140		7075		5289		5735		6438		6411	
barbiturici	135	1,7	600	8,5	198	3,7	268	4,7	421	6,5	489	7,6
cocaina	442	5,4	427	6,0	304	5,7	388	6,8	766	11,9	336	5,2
cannabinoidi	168	2,1	478	6,8	472	8,9	595	10,4	182	2,8	326	5,1
allucinogeni	37	0,5	37	0,5	14	0,3	33	0,6	11	0,2	49	0,8
oppioidi	5332	65,5	4281	60,5	3173	60,0	3236	56,4	3704	57,5	3226	50,3
antidepressivi		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,0	12	0,2
eroina	16	0,2	29	0,4	3	0,1	7	0,1		0,0	5	0,1
amfetamine	43	0,5		0,0	12	0,2	46	0,8		0,0	23	0,4

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto	deg. media x ricovero	ricoveri x soggetto
media	16,3	1,3	15,3	1,2	12,7	1,4	13,8	1,4	14,8	1,3	14,4	1,3
barbiturici	9,6	1,2	25,0	1,1	11,0	1,3	15,8	1,1	16,8	1,0	16,3	1,0
cocaina	13,8	1,2	14,7	1,1	8,2	1,3	9,7	1,3	15,0	1,3	7,8	1,2
cannabinoidi	11,2	1,1	28,1	1,2	20,5	1,2	22,9	1,1	9,1	1,1	8,0	1,5
allucinogeni	3,7	1,3	6,2	1,0	4,7	1,0	6,6	1,3	5,5	1,0	16,3	1,0
oppioidi	18,4	1,4	16,2	1,2	13,8	1,3	14,7	1,4	18,1	1,0	18,5	1,2
antidepressivi		0,0		0,0		0,0		0,0	1,0	1,0	4,0	1,0
eroina	2,3	1,0	7,3	1,0	3,0	1,0	7,0	1,0			2,5	1,0
amfetamine	10,8	1,0				4,0		11,5			1,0	1,3

Tab. 6 Ricoveri presso gli ospedali dell'area metropolitana di Bologna per problemi collegati all'uso di sostanze stupefacenti

Raffronti per dipendenza, abuso, psicosi, avvelenamenti - Periodo 2000-2005

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dipendenza da droghe	316		295		272		254		245		219	
dipendenza da allucinogeni	4	1,3	3	1,0	2	0,7		0,0	1	0,4	2	0,9
dipendenza da barbiturici	8	2,5	10	3,4	4	1,5	10	3,9	9	3,7	10	4,6
dipendenza da cannabinoidi	6	1,9	5	1,7	10	3,7	9	3,5	6	2,4	15	6,8
dipendenza da cocaina	24	7,6	20	6,8	23	8,5	21	8,3	26	10,6	19	8,7
dipendenza da oppioidi	190	60,1	180	61,0	142	52,2	118	46,5	184	75,1	154	70,3
dipendenza da altra droga	29	9,2	25	8,5	24	8,8	21	8,3	25	10,2	26	11,9
combinazioni di oppioidi con altre sost.	52	16,5	52	17,6	66	24,3	75	29,5	90	36,7	87	39,7
dipendenza amfetamine	3	0,9		0,0	1	0,4		0,0		0,0	1	0,5
Abuso di droghe senza dipendenza	79		80		89		95		106		146	
Abuso di barbiturici	4	5,1	12	15,0	12	13,5	6	6,3	17	16,0	20	13,7
Abuso di cocaina	8	10,1	9	11,3	14	15,7	19	20,0	25	23,6	24	16,4
Abuso di antidepressivi	2	2,5	2	2,5	2	2,2	1	1,1	1	0,9	3	2,1
Abuso di oppioidi	22	27,8	14	17,5	15	16,9	19	20,0	10	9,4	13	8,9
Abuso di allucinogeni	3	3,8	3	3,8	1	1,1	3	3,2	1	0,9	1	0,7
Abuso di cannabinoidi	9	11,4	12	15,0	13	14,6	17	17,9	14	13,2	26	17,8
abuso di amfetamine	1	1,3		0,0	2	2,2	4	4,2		0,0	3	2,1
Altri abusi misti non specificati	30	38,0	28	35,0	30	33,7	26	27,4	44	41,5	65	44,5
Psicosi indotte da droghe	44		42		25		37		29		32	
Sindrome astinenza	16	36,4	7	16,7	3	12,0	10	27,0	3	10,3	7	21,9
Intossicazione patologica	5	11,4	15	35,7	12	48,0	7	18,9	8	27,6	10	31,3
Disturbi psichici vari	23	52,3	20	47,6	10	40,0	20	54,1	18	62,1	15	46,9
Avvelenamenti	56	15,1	40	10,6	18	6,0	21	7,1	29	9,0	21	
da oppio	25	44,6	19	47,5	7	38,9	8	38,1	11	37,9	8	38,1
da eroina	7	12,5	4	10,0	1	5,6	1	4,8		0,0	2	9,5
da altre sostanze	24	42,9	17	42,5	10	55,6	12	57,1	18	62,1	13	61,9