

## Uso di sostanze e problemi connessi: studio sulla Street Rave Parade 2004 per stimare la prevalenze di problemi che incontrano i consumatori di sostanze stupefacenti.

Durante la Street Rave Parade di Bologna (2003) sono stati intervistati (questionario a risposte chiuse relativamente ai problemi incontrati negli ultimi 3 anni, alle sostanze provate, a quelle utilizzate nel corso dell'ultimo anno, etc...) 375 soggetti (34% femmine), età media 24.2 anni. Il 79% ha dichiarato di avere avuto più episodi di alterazione alcolica nel corso dell'ultimo anno. Il 91% ha provato almeno una sostanza stupefacente nella vita, l'86% nell'ultimo anno. L'età media di primo consumo è di 15.5 anni e l'uso dura mediamente da più di 8 anni, prevalentemente nei fine settimana. Nel corso dell'ultimo anno il 94% ha utilizzato cannabinoidi, il 46% cocaina, il 37% speed, il 34% funghi allucinogeni, il 33% ecstasy, il 30% amfetamine, il 28% LSD, il 25% popper, il 20% oppio, il 17% ketamina, l'11% salvia divinorum, il 9% eroina, l'8% psicofarmaci, il 5% crack, il 3% plegine, il 3% morfina, il 2% crystal meth, il 2% metadone. Il 6.2% utilizza la via iniettiva. Il 51.4% ha avuto problemi connessi l'uso di sostanze: il 19.5% problemi di tipo psicologico, il 14.2% problemi specifici per uso di sostanze pesanti, il 12.4% problemi con la giustizia, il 9% svenimenti, il 6.8% problemi fisici, il 6.2% problemi di tipo sanitario, il 5.6% incidenti stradali.

I soggetti maggiormente a rischio sono i più giovani, che iniziano prima, e che usano le sostanze da più tempo. Il rischio raddoppia per chi ha avuto episodi di alterazione alcolica e risulta triplicato per i poliassuntori. I consumatori di Ecstasy e psicofarmaci hanno una probabilità elevata di problemi sanitari (ospedalizzazioni).